

LES QUATRE QUESTIONNAIRES

- ❖ *Perinatal PTSD Questionnaire*
- ❖ Questionnaire sur l'accompagnement
- ❖ Inventaire d'anxiété Trait STAI- forme Y-B
- ❖ Questionnaire socio-démographique

FLOW CHART

	V1 Visite de sélection et d'inclusion	V2 Prise de rdv	V3 4 sem
<i>Repérage de l'enfant et éligibilité (Investigateur)</i>	x		
<i>Information participant (Investigateur)</i>	x		
<i>Recueil de la non-opposition</i>	x		
<i>Prise de rendez-vous pour administration des questionnaires (psychologue)</i>		x	
<i>Questionnaire Périnatal PTSD (psychologue)</i>			x
<i>Questionnaire sur l'accompagnement précoce (psychologue)</i>			x
<i>Inventaire d'anxiété (psychologue)</i>			x
<i>Questionnaire sociodémographique (psychologue)</i>			x



DANAO

Etude de l'effet du moment du diagnostic (anténatal vs postnatal) sur les réactions post-traumatiques de parents d'enfants opérés d'atrézie de l'œsophage.

PROMOTEUR DE L'ETUDE

CHU de Lille

Investigateur principal

Pr Véronique DEBARGE

PUPH Gynécologue-Obstétricien

Hôpital Jeanne de Flandre – 59037 Lille Cedex

Tel : 03.20.44.67.99

Mail : veronique.DEBARGE@chru-lille.fr

ARC en investigation

KatiaLINE GROFF

Tel : 03.20.44.60.58 Poste 30475

Mail : katialine.groff@chru-lille.fr

CONCEPTION DE L'ETUDE

Vécu psychologique des parents d'enfants opérés d'atrézie de l'œsophage en fonction du moment du diagnostic

Il s'agit d'une étude observationnelle, multicentrique nationale (34 centres impliqués), transversale en psychologie dont l'objectif est de décrire et comparer les niveaux de réactions post-traumatiques des mères à l'annonce du diagnostic d'AO de leur enfant.

Objectif principal de l'étude :

Comparer les niveaux de réactions post-traumatiques chez les mères d'enfants de 12 à 24 mois opérés d'une AO de type 1 ou 3 selon le moment du diagnostic d'AO (mères ayant reçu un diagnostic anténatal « mères DAN » versus mères ayant reçu un diagnostic postnatal « mères DPN »).

Critère principal d'évaluation :

Le score au *Perinatal Posttraumatic stress disorder Questionnaire* (score PPQ) mesuré chez les mères.

L'étude concerne des mères d'enfants âgés de 12 à 24 mois opérés d'une AO de type 1 ou 3.

Critères d'inclusion :

- Etre mère d'un enfant vivant âgé de 12 à 24 mois ayant subi une intervention chirurgicale néonatale suite au diagnostic d'une AO de type 1 ou de type 3 ;
- Ne pas s'être opposée à participer à l'étude (formulaire d'information et de non opposition signé par l'investigateur) ;
- Etre assurée sociale.

Critères de non inclusion :

- Femme dont l'enfant porteur d'une AO est porteur d'une anomalie chromosomique ;
- Femme dont l'enfant porteur d'une AO présente un syndrome polymalformatif ;
- Femme mineure ;
- Femme enceinte;
- Femme ne maîtrisant pas le français ;
- Femme incapable de consentir, ou bénéficiant d'un régime de protection juridique (tutelle ou curatelle);
- Femme privée de liberté.

Une étude ancillaire sera réalisée chez les pères présents qui acceptent de participer à l'étude. Les mêmes objectifs que ceux décrits chez les mères seront étudiés.

DEROULEMENT DE LA RECHERCHE

