

VÉCU PSYCHOLOGIQUE DES PARENTS D'ENFANTS OPÉRÉS D'ATRÉSIE DE L'ŒSOPHAGE EN FONCTION DU MOMENT DU DIAGNOSTIC (anténatal vs postnatal)

DANA O

Manel HANAFI
Psychologue - CHU de Lille

Unité de gastro-entérologie, hépatologie et nutrition pédiatriques
Centre de Référence des Affections Congénitales et Malformatives de l'œsophage



VÉCU PSYCHOLOGIQUE DES PARENTS D'ENFANTS OPÉRÉS D'ATRÉSIE DE L'ŒSOPHAGE EN FONCTION DU MOMENT DU DIAGNOSTIC (anténatal vs postnatal)

DANAO

NOM DES PARTICIPANTS	FONCTION
Coulon N	Maitre de conférences psychologie du développement
Hanafi M	Psychologue
Gottrand F	PUPH Gastro pédiatre
Sfeir R	PH chirurgie pédiatrique
Armand V	Présidente association AFAO
Debarge V	PUPH Gynécologue Obstétricien
Barbet A	Chef de projet FIMATHO

VÉCU PSYCHOLOGIQUE DES PARENTS D'ENFANTS OPÉRÉS D'ATRÉSIE DE L'ŒSOPHAGE EN FONCTION DU MOMENT DU DIAGNOSTIC (anténatal vs postnatal)

DANAO

- En ante ou en post natal : Révélation d'une AO :
 - Situation traumatisante
 - Bouleversement émotionnel à tonalité négative
 - Etats de stress post-traumatiques
- Littérature : données rares, contradictoires

VÉCU PSYCHOLOGIQUE DES PARENTS D'ENFANTS OPÉRÉS D'ATRÉSIE DE L'ŒSOPHAGE EN FONCTION DU MOMENT DU DIAGNOSTIC (anténatal vs postnatal)

DANAO



Diagnostic anténatal d'une AO présente un risque pour le début du parcours de vie de l'enfant et celui de ses parents ?



Délai entre la révélation de l'AO et la réparation chirurgicale permet aux parents de développer précocement des stratégies adaptatives à partir des informations et du soutien reçus avant la naissance?

Hypothèse :

Le moment du diagnostic a un impact sur les réactions post traumatiques parentales des deux premières années suivant la naissance d'un enfant opéré d'une AO.

VÉCU PSYCHOLOGIQUE DES PARENTS D'ENFANTS OPÉRÉS D'ATRÉSIE DE L'ŒSOPHAGE EN FONCTION DU MOMENT DU DIAGNOSTIC (anténatal vs postnatal)

DANAO

Cette étude concerne les parents d'enfants porteur d'une malformation congénitale rare : l'atrésie de l'œsophage et s'intéresse à leurs éventuelles réactions post traumatiques en fonction du moment de l'annonce du diagnostic.

Il s'agit d'une étude observationnelle, multicentrique nationale, transversale en psychologie dont l'objectif est de décrire et comparer les niveaux de réactions post-traumatiques des mères selon le moment du diagnostic d'AO de leur enfant.

VÉCU PSYCHOLOGIQUE DES PARENTS D'ENFANTS OPÉRÉS D'ATRÉSIE DE L'ŒSOPHAGE EN FONCTION DU MOMENT DU DIAGNOSTIC (anténatal vs postnatal)

DANAO

L'étude concerne des mères d'enfants âgés de 12 à 24 mois opérés d'une AO de type 1 ou 3.

→ 240 mères


Critères de non inclusion :

- Femme dont l'enfant porteur d'une AO est porteur d'une anomalie chromosomique ;
- Femme dont l'enfant porteur d'une AO présente un syndrome polymalformatif ;

Une étude ancillaire sera réalisée chez les pères présents qui acceptent de participer à l'étude.

Les mêmes objectifs que ceux décrits chez les mères seront étudiés.

Plan expérimental



**VÉCU PSYCHOLOGIQUE DES PARENTS D'ENFANTS OPÉRÉS D'ATRÉSIE
DE L'ŒSOPHAGE EN FONCTION DU MOMENT DU DIAGNOSTIC
(anténatal vs postnatal)**

DANAO

2 groupes
comparés

Groupe DAN

Groupe DPN

groupe dans lequel le
diagnostic d'AO
aura été suspecté
pendant la grossesse

groupe dans lequel le
diagnostic d'AO
aura été suspecté après
la naissance

**VÉCU PSYCHOLOGIQUE DES PARENTS D'ENFANTS OPÉRÉS D'ATRÉSIE
DE L'ŒSOPHAGE EN FONCTION DU MOMENT DU DIAGNOSTIC
(anténatal vs postnatal)**

DANA O

MERCI DE VOTRE ATTENTION